PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RenuTend injekční suspenze pro koně

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:
Tenogenně indukované koňské alogenní mezenchymální kmenové buňky pocházející z periferní krve (tpMSCs): 2,0–3,5x10^6

Pomocné látky:

Kvalitativní složení pomocných látek a dalších složek
Dulbeccovo modifikované eagle medium s nízkým obsahem glukózy
Dimethylsulfoxid

Čirá bezbarvá suspenze.

3. KLINICKÉ INFORMACE

3.1 Cílové druhy zvířat

Koně

3.2 Indikace pro použití pro každý cílový druh zvířat

Podpora hojení poškození šlach a mezikostních svalů u koní.

3.3 Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

3.4 Zvláštní upozornění

Bylo prokázáno, že přípravek je účinný u koní, kteří si v důsledku přetrénování poprvé poranili šlachu povrchového ohybače prstu přední končetiny nebo mezikostní sval zadní či přední končetiny. Údaje o účinnosti léčby jiných šlach a vazů nejsou k dispozici. Léčba traumatických poranění s laceracemi nebo kompletní rupturou šlach nebyla hodnocena. Tento veterinární léčivý přípravek není určen k léčbě těchto poranění.

Účinnost veterinárního léčivého přípravku byla prokázána v hlavní terénní studii u koní, kteří před zjištěním poranění šlachy nebo mezikostního svalu absolvovali trénink nebo soutěže v drezurních či parkurových disciplínách.

Součástí rehabilitace poranění šlach a mezikostního svalu je standardní program klidového režimu v boxu a pozvolného navyšování objemu fyzické aktivity pod dohledem veterinárního lékaře. Tento program by měl být upravován na základě opakovaných ultrazvukových vyšetření a sledování klinických příznaků, jako je kulhání, zvýšená teplota a otok postiženého místa.

Účinnost a bezpečnost veterinárního léčivého přípravku byla prokázána v hlavní terénní studii po jednorázovém podání přípravku a současném jednorázovém systémovém podání NSAID. Na základě

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem lze v individuálním případě v den podání intralezionální injekce aplikovat jednorázovou dávku systémového NSAID.

3.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Pokud je veterinární léčivý přípravek uchováván v kapalném dusíku, může přímé vystavení kapalnému dusíku nebo jeho chladným výparům způsobit rozsáhlé poškození tkání nebo popáleniny. Při odpařování kapalného dusíku může dojít až k 700násobnému zvětšení jeho objemu, což může způsobit riziko roztržení injekčních lahviček, které nemají pojistný ventil. S nádobami s kapalným dusíkem smí manipulovat pouze řádně vyškolený personál. Manipulace s kapalným dusíkem by měla probíhat v dobře větraném prostoru. Před vyjmutím injekční lahvičky z nádoby s kapalným dusíkem je nutné použít ochranný oděv včetně rukavic, dlouhých rukávů a obličejové masky nebo brýlí.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může tento veterinární léčivý přípravek způsobit bolest, lokální zánětlivé reakce a otok v místě injekčního podání, které mohou přetrvávat několik týdnů. Vyskytnout se může také přechodná horečka. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí:
Neuplatňuje se.

3.6 Nežádoucí účinky

Koně:

Velmi časté (> 1 zvíře / 10 ošetřených zvířat):	Reakce v místě injekčního podání (např. zteplání v místě injekčního podání, bolest v místě injekčního podání, otok končetiny a zvětšený obvod končetiny)[1]

[1] Mírné a vyskytly se během prvních 10 dní po podání.

Hlášení nežádoucích účinků je důležité. Umožňuje nepřetržité sledování bezpečnosti veterinárního léčivého přípravku. Hlášení je třeba zaslat, pokud možno, prostřednictvím veterinárního lékaře, buď držiteli rozhodnutí o registraci, nebo jeho místnímu zástupci, nebo příslušnému vnitrostátnímu orgánu prostřednictvím národního systému hlášení. Podrobné kontaktní údaje naleznete v příbalové informaci.

3.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

3.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce

Údaje nejsou k dispozici.

3.9 Cesty podání a dávkování

Cesta podání:
Intralezionální podání.

Doporučené dávkování:
Jednorázové podání jedné dávky (1 ml) na zvíře.

Příprava injekční suspenze a způsob podání:
Veterinární léčivý přípravek musí být podán intralezionálně veterinárním lékařem, který dodrží zvláštní opatření k zajištění sterility při podání injekce. Manipulace s veterinárním léčivým přípravkem a injekční podání přípravku musí probíhat za sterilních podmínek a v čistém prostředí.

Veterinární léčivý přípravek je třeba podat okamžitě po rozmrazení, aby byla zachována životaschopnost buněk.

S použitím vhodných rukavic vyjměte z mrazáku/kapalného dusíku injekční lahvičku a ihned ji rozmrazte při teplotě 25 °C až 37 °C, např. ve vodní lázni, až do úplného rozmrazení obsahu (přibližně 5 minut).

Pokud jsou po rozmrazení v lahvičce viditelné shluky buněk, jemně injekční lahvičku protřepejte, dokud není suspenze čirá a bezbarvá.

Odstraňte uzávěr injekční lahvičky a natáhněte suspenzi do sterilní injekční stříkačky.

Použijte jehlu s průměrem 22G nebo větším, aby se zabránilo poškození buněk.

Injekci aplikujte intralezionálně pod kontrolou ultrazvuku. Pro zajištění bezpečného intralezionálního injekčního podání použijte podle potřeby a v souladu s dobrou veterinární praxí chemické či fyzické prostředky omezení pohybu zvířete. Pokud je to nutné, změňte po vpíchnutí jehly do šlachy nebo mezikostního svalu směr injekce, aby bylo dosaženo léze. Pomalu vstříkněte suspenzi. V případě větší léze jehlu během vstřikování suspenze pomalu vytahujte, aby došlo k rozptýlení buněk v celé lézi.

3.10 Příznaky předávkování (a kde je relevantní, první pomoc a antidota)

Údaje nejsou k dispozici.

3.11 Zvláštní omezení pro použití a zvláštní podmínky pro použití, včetně omezení používání antimikrobních a antiparazitárních veterinárních léčivých přípravků, za účelem snížení rizika rozvoje rezistence

Neuplatňuje se.

3.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

4. FARMAKOLOGICKÉ INFORMACE

4.1 ATCvet kód:

QM09AX90

4.2 Farmakodynamika

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje tenogenně indukované koňské alogenní mezenchymální kmenové buňky pocházející z periferní krve (tpMSCs). Tenogenní indukce mezenchymálních kmenových buněk má za cíl podpořit mechanismy obnovy tkání a hojení šlach, jako je zlepšení produkce extracelulární matrix. Účinky po podání tpMSCs v rámci experimentálního modelu poranění šlach u koní se projevily zlepšením ultrazvukové echogenity a skóre stavu vláken, vyšším procentem nepoškozených a zcela vyrovnaných svazků vláken šlachy (vyznačujících se vyšším obsahem kolagenu typu I a nižším obsahem kolagenu typu III), a také na základě přítomnosti hladkosvalového aktinu.

V rámci hlavní klinické studie byla účinnost léčby ve srovnání se skupinou s placebem hodnocena za podmínek standardního programu klidového režimu v boxu a pozvolného navyšování objemu fyzické aktivity pod dohledem veterináře. Bylo prokázáno významné zvýšení skóre vyrovnání vláken v lézi šlachy, což odpovídalo zlepšování echogenity a velikosti plochy průřezu při ultrazvukových vyšetřeních.

4.3 Farmakokinetika

Po injekčním podání veterinárního léčivého přípravku kmenové buňky nemigrují ani se nepřesouvají z léčené šlachy do okolních tkání nebo do příslušné lymfatické uzliny.

5. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

5.1 Hlavní inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

5.2 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po rozmrazení podle návodu: spotřebujte ihned.

5.3 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte zmrazené (-90 °C až -70 °C) nebo v kapalném dusíku.

5.4 Druh a složení vnitřního obalu

Cyklo-olefinová kopolymerová (COC) injekční lahvička s termoplastickým elastomerovým uzávěrem (TPE) a polyethylenovým (HDPE) uzávěrem o vysoké hustotě, obsahující jednu dávku suspenze kmenových buněk.

Každé balení (polykarbonátový obal nebo kartónová krabička) obsahuje jednu dávku veterinárního léčivého přípravku: jednu injekční lahvičku (1 ml) se suspenzí kmenových buněk.

5.5 Zvláštní opatření pro likvidaci nepoužitých veterinárních léčivých přípravků nebo odpadů, které pochází z těchto přípravků

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, likvidujte odevzdáním v souladu s místními požadavky a národními systémy sběru, které jsou platné pro příslušný veterinární léčivý přípravek.

6. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

7. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/22/282/001

8. DATUM PRVNÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19/04/2022

9. DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

10. KLASIFIKACE VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici v databázi přípravků Unie (*https://medicines.health.europa.eu/veterinary*).

PŘÍLOHA II

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Žádné.

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Polykarbonátový obal nebo kartonová krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RenuTend injekční suspenze pro koně

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Tenogenně indukované koňské alogenní mezenchymální kmenové buňky pocházející z periferní krve: (tpMSCs): 2,0–3,5x10^6

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 1 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Intralezionální podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}
Po rozmrazení spotřebujte ihned.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte zmrazené (-90 °C až -70 °C) nebo v kapalném dusíku.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/2/22/282/001

15. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Injekční lahvička obsahující suspenzi kmenových buněk

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RenuTend

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

2,0–3,5×10^6 tpMSCs

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp.{mm/rrrr}
Po rozmrazení spotřebujte ihned.

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. Název veterinárního léčivého přípravku

RenuTend injekční suspenze pro koně

2. Složení

Každá dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:
Tenogenně indukované koňské alogenní mezenchymální kmenové buňky pocházející z periferní krve (tpMSCs): $2{,}0–3{,}5\times10^{6}$

Čirá bezbarvá suspenze

3. Cílové druhy zvířat

Koně

4. Indikace pro použití

Podpora hojení poškození šlach a mezikostních svalů u koní.

5. Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6. Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro bezpečné použití u cílových druhů zvířat:
Bylo prokázáno, že přípravek je účinný u koní, kteří si v důsledku přetrénování poprvé poranili šlachu povrchového ohybače prstu přední končetiny nebo mezikostní sval zadní či přední končetiny. Údaje o účinnosti léčby jiných šlach a vazů nejsou k dispozici. Léčba traumatických poranění s laceracemi nebo kompletní rupturou šlach nebyla hodnocena. Tento veterinární léčivý přípravek není určen k léčbě těchto poranění.

Účinnost veterinárního léčivého přípravku byla prokázána v hlavní terénní studii u koní, kteří před zjištěním poranění šlachy nebo mezikostního svalu absolvovali trénink nebo soutěže v drezurních či parkurových disciplínách.

Součástí rehabilitace poranění šlach a mezikostního svalu je standardní program klidového režimu v boxu a pozvolného navyšování objemu fyzické aktivity pod dohledem veterinárního lékaře. Tento program by měl být upravován na základě opakovaných ultrazvukových vyšetření a sledování klinických příznaků, jako je kulhání, zvýšená teplota a otok postiženého místa.

Účinnost a bezpečnost veterinárního léčivého přípravku byla prokázána v hlavní terénní studii po jednorázovém podání přípravku a současném jednorázovém systémovém podání NSAID. Na základě zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem lze v individuálním případě v den podání intralezionální injekce aplikovat jednorázovou dávku systémového NSAID.

Zvláštní opatření pro osobu, která podává veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Pokud je veterinární léčivý přípravek uchováván v kapalném dusíku, může přímé vystavení kapalnému dusíku nebo jeho chladným výparům způsobit rozsáhlé poškození tkání nebo popáleniny. Při odpařování kapalného dusíku může dojít až k 700násobnému zvětšení jeho objemu, což může způsobit riziko roztržení injekčních lahviček, které nemají pojistný ventil. S nádobami s kapalným dusíkem smí manipulovat pouze řádně vyškolený personál. Manipulace s kapalným dusíkem by měla probíhat v dobře větraném prostoru. Před vyjmutím injekční lahvičky z nádoby s kapalným dusíkem je nutné použít ochranný oděv, včetně rukavic, dlouhých rukávů a obličejové masky nebo brýlí.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může tento veterinární léčivý přípravek způsobit bolest, lokální zánětlivé reakce a otok v místě injekčního podání, které mohou přetrvávat několik týdnů. Vyskytnout se může také přechodná horečka. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce:
Údaje nejsou k dispozici.

Předávkování:
Údaje nejsou k dispozici.

Hlavní inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

7. Nežádoucí účinky

Koně:

Velmi časté (> 1 zvíře / 10 ošetřených zvířat):
Reakce v místě injekčního podání (např. zteplání v místě injekčního podání, bolest v místě injekčního podání, otok končetiny a zvětšený obvod končetiny)[1]

[1] Mírné a vyskytly se během prvních 10 dní po podání.

Hlášení nežádoucích účinků je důležité. Umožňuje nepřetržité sledování bezpečnosti přípravku. Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, obraťte se prosím nejprve na svého veterinárního lékaře. Nežádoucí účinky můžete hlásit také držiteli rozhodnutí o registraci nebo místnímu zástupci držitele rozhodnutí o registraci s využitím kontaktních údajů uvedených na konci této příbalové informace nebo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

8. Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání

Intralezionální podání.

Doporučené dávkování:
Jednorázové podání jedné dávky (1 ml) na zvíře.

9. Informace o správném podání

Příprava injekční suspenze a způsob podání:
Veterinární léčivý přípravek musí být podán intralezionálně veterinárním lékařem, který dodrží zvláštní opatření k zajištění sterility při podání injekce. Manipulace s veterinárním léčivým přípravkem a injekční podání přípravku musí probíhat za sterilních podmínek a v čistém prostředí.

Následující informace jsou určeny pouze pro veterinárního lékaře:
Veterinární léčivý přípravek je třeba podat okamžitě po rozmrazení, aby byla zachována životaschopnost buněk.

S použitím vhodných rukavic vyjměte z mrazáku/kapalného dusíku injekční lahvičku a ihned ji rozmrazte při teplotě 25 °C až 37 °C, např. ve vodní lázni, až do úplného rozmrazení obsahu (přibližně 5 minut).

Pokud jsou po rozmrazení v lahvičce viditelné shluky buněk, jemně injekční lahvičku protřepejte, dokud není suspenze čirá a bezbarvá.

Odstraňte uzávěr injekční lahvičky a natáhněte suspenzi do sterilní injekční stříkačky.

Použijte jehlu s průměrem 22G nebo větším, aby se zabránilo poškození buněk.

Injekci aplikujte intralezionálně pod kontrolou ultrazvuku. Pro zajištění bezpečného intralezionálního injekčního podání použijte podle potřeby a v souladu s dobrou veterinární praxí chemické či fyzické prostředky omezení pohybu zvířete. Pokud je to nutné, změňte po vpíchnutí jehly do šlachy nebo mezikostního svalu směr injekce, aby bylo dosaženo léze. Pomalu vstříkněte suspenzi. V případě větší léze jehlu během vstřikování suspenze pomalu vytahujte, aby došlo k rozptýlení buněk v celé lézi.

10. Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

11. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte a přepravujte zmrazené (-90 °C až -70 °C) nebo v kapalném dusíku.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketách po Exp. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po rozmrazení podle návodu: spotřebujte ihned.

12. Zvláštní opatření pro likvidaci

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, likvidujte odevzdáním v souladu s místními požadavky a platnými národními systémy sběru. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

13. Klasifikace veterinárních léčivých přípravků

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. Registrační čísla a velikosti balení

EU/2/22/282/001

Každé balení (polykarbonátový obal nebo kartónová krabička) obsahuje jednu dávku veterinárního léčivého přípravku: jednu injekční lahvičku (1 ml) se suspenzí kmenových buněk.

15. Datum poslední revize příbalové informace

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici v databázi přípravků Unie (*https://medicines.health.europa.eu/veterinary*).

16. Kontaktní údaje

Držitel rozhodnutí o registraci:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Boehringer Ingelheim Veterinary Medicine Belgium NV
Noorwegenstraat 4
9940 Evergem
Belgie

Místní zástupci a kontaktní údaje pro hlášení podezření na nežádoucí účinky:

België/Belgique/Belgien
Boehringer Ingelheim Animal
Health Belgium SA
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Република България
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Виена, Австрия
Tel: +359 2 958 79 98

Česká republika
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Purkyňova 2121/3
CZ - 110 00, Praha 1
Tel: +420 234 655 111

Danmark
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tlf: + 45 3915 8888

Lietuva
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Lietuvos filialas
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Vīne, Austrija
Tel: +370 5 2595942

Luxembourg/Luxemburg
Boehringer Ingelheim Animal
Health Belgium SA
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Magyarország
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelep
Lechner Ö. Fasor 10.
H-1095 Budapest
Tel: +36 1 299 8900

Malta
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, il-Ġermanja
Tel: +353 1 291 3985

Deutschland
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Tel: 0800 290 0 270

Eesti
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Eesti filiaal
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viin, Austria
Tel: +372 612 8000

Ελλάδα
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία
Τηλ: +30 2108906300

España
Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 404 51 00

France
Boehringer Ingelheim Animal Health France, SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Tél : +33 4 72 72 30 00

Hrvatska
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Beč, Austrija
Tel: +385 1 2444 600

Ireland
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany
Tel: +353 1 291 3985

Ísland
Vistor
Hörgatún 2
210 Garðabær
Sími: + 354 535 7000

Nederland
Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Tel: +31 20 799 6950

Norge
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tlf: +47 66 85 05 70

Österreich
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel: +43 1 80105-6880

Polska
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa
Tel.: + 48 22 699 0 699

Portugal
Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal, Unipessoal, Lda.
Avenida de Pádua, 11
1800-294 Lisboa
Tel: +351 21 313 5300

România
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Sucursala Bucureşti
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viena, Austria
Tel: +40 21 302 28 00

Slovenija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Dunaj, Avstrija
Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viedeň, Rakúsko
Tel: +421 2 5810 1211

Italia
Boehringer Ingelheim Animal Health
Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 3
20139 Milano
Tel: +39 02 53551

Κύπρος
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία
Τηλ: +30 2108906300

Latvija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Latvijas filiāle
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viena, Austrija
Tel: +371 67 240 011

Suomi/Finland
Vetcare Oy
PL/PB 99
24101 Salo
Puh/Tel: + 358 201443360

Sverige
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tel: +46 (0)40-23 34 00

United Kingdom (Northern Ireland)
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany
Tel: +353 1 291 3985